

Calcikel 300

Suplemento mineral

Composición

Cada ml contiene:

Gluconato de Calcio Monohidrato	279.24 mg
Cloruro de Magnesio	40 mg
Excipientes	cbp. 1ml

Indicaciones

Hipocalcemia aguda en vacas, ovejas y cerdas (paresia puerperal, fiebre de leche).

Hipomagnesemia aguda en el ganado (tetania de los pastos).

Dosis y Vía de Administración:

Bovinos adultos (500-600 kg): infundir 500 ml (eq. 12,5 g calcio + 2,4 g magnesio).

Ovinos: 1 ml/ kg de peso corporal.

Porcinos: 0.8 ml/ kg de peso corporal o 40 ml/50 kg de peso corporal.

La solución debe administrarse mediante inyección intravenosa lenta, respetando un tiempo de infusión de al menos 20 min. En caso de recaída después de la terapia, debe administrarse nuevamente respetando un intervalo de al menos 6 horas entre el primer y el segundo tratamiento.

Si es posible, la solución debe calentarse cerca de la temperatura corporal.

Advertencias:

El producto no es adecuado para administración subcutánea.

Se aconseja controlar periódicamente el pulso, el ritmo cardiaco y la circulación sanguínea durante la administración intravenosa.

Conservar fuera de alcance de los niños y animales domésticos.

Almacenar debajo de 30°C y protegido de la luz directa.

Periodo de Retiro: No posee un periodo de retiro.

Presentación: Frascos de 500 ml (incluye venocclisis).

Registro Sanitario: MV- 6833

