

Penikan P

Infusión Intramamaria



Composición

Bencilpenicilina procaínica	300.000 UI
Sulfato de Kanamicina	100 mg
Prednisolona	20 mg
Excipientes hasta	10 g.

Especies de Destino:

Bovinos ,Ovinos y Caprinos

Indicaciones:

Tratamiento de mastitis aguda, que suele ir acompañada de dolorosas reacciones tisulares.

La sinergia de la combinación de los dos antibióticos presenta una actividad antibacteriana frente a la mayor variedad de patógenos mamarios (Streptococcus agalactiae, Str. dysgalactiae, Str. uberis, Staphylococcus aureus, Corynebacterium pyogenes, E. coli).

Dosis y modo de administración:

Bovinos: 1 jeringa por cuarto afectado.

Ovinos y caprinos: 1/2 jeringa por cuarto afectado.

Antes del tratamiento ordeñar profundamente, limpiar y desinfectar los pezones.

Posteriormente, inyectar el ungüento en el canal del pezón y distribuir realizando un masaje ascendente.

Si es necesario, la administración puede repetirse con intervalos de 12 a 24 horas.

Periodo de retiro:

Carne: 4 días.

Leche: 3 días.

Presentación:

Tubos de 10 g.

Registro Sanitario:

MV- 1433.

